

ULCÈRES DE JAMBE VEINEUX TRAITÉS PAR SYSTÈME DE COMPRESSION MULTITYPE URGOK2 , SUIVIS EN VILLE

Vincent CREBASSA⁽¹⁾, François-André ALLAERT⁽²⁾
(1) Clinique du Millénaire, Montpellier, (2) CEN Biotech, Dijon, France
Mots-clés : Thérapeutique, Compression, Ulcère de jambe

INTRODUCTION - OBJECTIF

L'objectif de cette étude est de décrire les caractéristiques cliniques et l'évolution des ulcères de jambe veineux traités par le système de compression multi-type UrgoK2 et d'évaluer son acceptabilité en ville tant par le recueil de l'opinion des soignants sur la pose des bandes que par son acceptabilité par les patients.

MATÉRIEL - MÉTHODE

Les caractéristiques démographiques et cliniques des patients souffrant d'un ulcère de jambe veineux bénéficiant d'une prescription du système de compression multitype UrgoK2 ont été décrites. Les patients ont été suivis par des infirmiers(ères) libéraux(ales) avec le système NursTrial qui permet de constituer un dossier de soins des plaies et cicatrisation sur smartphone.

RÉSULTATS


Un suivi documenté a été réalisé pour 102 patients. Ces derniers sont âgés en moyenne de 75 ans, sont de sexe féminin pour 55% d'entre eux et 67% sont en surcharge pondérale. Les ulcères sont d'origine veineuse dans 86% des cas et d'origine mixte dans 14% des cas. L'ancienneté de l'ulcère est supérieure à 6 mois (médiane) dans 29% des cas. Dans les deux tiers des cas (65%), il s'agit d'une récurrence d'ulcère. Un œdème est présent chez 75% des patients (modéré 55%, important 20%).

DES BANDES ANTÉRIEURES MAL POSÉES ET MAL PORTÉES

Les prises en charge précédentes de ces patients consistaient essentiellement en une compression élastique sous forme de chaussettes/bas chez 37% des patients, sous forme de bandes (hors UrgoK2) chez 17% des patients et les deux types de compression chez 14% des patients. 32% des patients n'avaient aucune compression. Lorsque le traitement était fait par bandes (17%), ces dernières étaient portées irrégulièrement dans 37% des cas, uniquement en journée dans 47% des cas, et en continu jour et nuit dans seulement 16% des cas.

Figure 1: Proportion de patients qui portaient leur précédentes bandes de compression

37% des patients portaient irrégulièrement leurs bandes de compression




Une application quotidienne des bandes était alors requise pour 89% des patients, et dans 68% des cas cette ré-application n'était « jamais » ou « rarement » faite avant le lever du patient ou après que ses jambes aient été surélevées pendant au moins une heure.

UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DES ULCÈRES SOUS URGOK2

Tous les patients inclus ont bénéficié de bandes de compression UrgoK2. Le plus fréquemment, les plaies ont été couvertes avec des pansements de type hydrocellulaire (27%), hydrofibre (24%) ou interface (16%). La durée moyenne de suivi des patients était de 37 ± 34 jours. Au terme de ce suivi, le taux de cicatrisation des plaies était de 11%. Une amélioration cicatricielle était également rapportée chez 62% des patients; l'état des plaies demeurait inchangé dans 18% des cas et une détérioration était notée dans 9% des cas.

Figure 2: Evaluation globale de l'évolution cicatricielle des plaies à la dernière visite (durée de suivi moyenne de 37 ± 34 jours)



La surface médiane des plaies est passée de 5,0 cm² (interquartile 1,0 – 19,3 cm²) à la visite initiale à 2,0 cm² (interquartile 0,4 – 10,0) lors de la dernière visite, avec une réduction relative de surface de 33% (valeur médiane ; interquartile 0% - 91%).

La proportion de patients présentant une réduction de surface ≥40% était de 47% et celle des patients présentant une réduction de surface ≥60% était de 41%.

OPINION DES SOIGNANTS SUR LES BANDES URGOK2

La pose du système de compression multitype prescrit a été jugé «facile» ou «très faciles» par 94% des les soignants. 76% des soignants ont jugé que leur acte infirmier était facilité par ces bandes. 79% des soignants ont jugé que les bandes UrgoK2 donnent plus confiance dans l'efficacité de la compression.

ACCEPTABILITÉ PAR LES SOIGNANTS ET LES PATIENTS DES BANDES URGOK2

Il a été décidé de poursuivre le traitement avec les bandes de compression UrgoK2 chez 92% des patients, . Au cours de cette étude, les bandes de compression UrgoK2 ont été très bien tolérées par la très grande majorité des patients. Dès la première semaine de traitement, les bandes UrgoK2 ont été perçues comme plus confortables que les précédentes bandes portées.

Les données cliniques issues de cette étude observationnelle française, menée en pratique courante, confortent et complètent :

- les preuves d'efficacité,
- de bonne tolérance et
- d'acceptation des bandes de compression UrgoK2 dans le traitement des ulcères de jambe veineux ou à prédominance veineuse.

La facilité de pose et la bonne tenue au cours du temps de ces bandes soulagent la charge de travail des soignants et facilitent l'organisation des soins.

Enfin, le confort de ces bandes portées de jour comme de nuit constitue un avantage certain dans l'observance et l'acceptabilité des patients vis-à-vis de leur traitement.

CAS CLINIQUE 1 : PATIENTE DE 76 ANS PRÉSENTANT UN ULCÈRE VEINEUX ÉVOLUANT DEPUIS 1 MOIS



Visite initiale




J22



J49

CAS CLINIQUE 2 : PATIENTE DE 83 ANS PRÉSENTANT UN ULCÈRE ARTÉRIOVEINEUX RÉCIDIVANT DATANT DE 73 MOIS



Visite initiale



J15



J25