

## Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

### Pansements

STADE DE LA PLAIE	EXSUDATS (0, +, ++, +++)	OBJECTIF DU TRAITEMENT	PANSEMENT PRIMAIRE	PANSEMENT SECONDAIRE
<b>NECROTIQUE</b>	0 à +	Hydrater pour éliminer mécaniquement le tissu nécrotique	HYDROGEL	Pansement <b>PAS</b> ou <b>PEU</b> absorbant type film PUR ou hydrocolloïde mince
<b>FIBRINEUSE</b>	0 à +	Hydrater pour éliminer mécaniquement le tissu fibrineux	HYDROGEL	Pansement <b>PAS</b> ou <b>PEU</b> absorbant type film PUR ou hydrocolloïde mince
	++ à +++	Contrôler les exsudats et maintenir un milieu humide pour éliminer mécaniquement le tissu fibrineux	ALGINATE HYDROFIBRE	Compresse stérile +/- pansement américain + système de maintien
<b>BOURGEONNANTE</b>	+	Contrôler les exsudats et favoriser la croissance du tissu de granulation	INTERFACE	+/- Compresse stérile + système de maintien
	++		HYDROCOLLOÏDE HYDROCELLULAIRE	+ Système de maintien si non adhésif
	+++		ALGINATE HYDROFIBRE	Compresse stérile +/- pansement américain + système de maintien
<b>EPIDERMISATION</b>		Maintenir le milieu humide et protéger le tissu d'épidermisation	INTERFACE HYDROCOLLOÏDE MINCE PANSEMENT GRAS (TULLE)	+/- Compresse stérile + système de maintien si non adhésif

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO-PHARMAT.

## Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

SITUATIONS PARTICULIERES	PANSEMENT	COMMENTAIRES
<b>PLAIE MALODORANTE</b> (tout stade)	PANSEMENT AU CHARBON	Utiliser en pansement primaire ou en pansement secondaire. Recouvrir d'un système de maintien.
<b>PLAIE INFECTEE</b> (tout stade)	ALGINATE HYDROFIBRE	Recouvrir d'un système de maintien et refaire le pansement tous les jours. Ne pas utiliser de pansement occlusif.
<b>PLAIE HEMORRAGIQUE</b> (tout stade)	ALGINATE	Recouvrir d'un système de maintien.
<b>PLAIE HYPERBOURGEONNANTE</b>	PANSEMENT GRAS (TULLE) + DERMOCORTICOIDE	Recouvrir d'un système de maintien. Laisser en place pendant 2 à 3 jours. L'utilisation de dermocorticoïdes est hors AMM. L'emploi d'un crayon de nitrate d'argent peut être un traitement alternatif.

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO-PHARMAT.