

Agnès CHINCHOLLE, Marie ANQUETIL, Jessica DAUBORD, Sonia BRISCHOUX, Marguerite JAVERLIAT, Voa RATSIMBAZAFY
 Service Pharmacie centrale,
 CHU LIMOGES – 2 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES
 sonia.brischoux@chu-limoges.fr

Objectif :

En raison d'une surconsommation des gants chirurgicaux, un groupe pluridisciplinaire (services de soins, pharmacie, hygiène) a réalisé une enquête auprès des services.
 Son objectif est d'évaluer les pratiques de port de gants médicaux.

Matériels et Méthodes :

- Elaboration d'un questionnaire (37 items) portant sur les connaissances du participant et les critères de choix des gants (Figure 1).
- Diffusion au personnel médical et paramédical hors bloc opératoire :1050 réponses attendues.
- Rédaction, recueil et analyse des résultats via le logiciel Sphinx®.

Résultats :

Population

- Taux de participation : 31%.
- Les participants sont des IDE en majorité (83%), des médecins (11%), des sages-femmes (4%) puis des chirurgiens (2%) (Figure 2).

Connaissance des gants :

- Méconnaissance des gants disponibles au CHU et dans le service (12%).
- Méconnaissance de la dénomination des gants (terme gants d'intervention)

Critères de choix des gants:

- Les 3 principaux critères de choix des gants sont sa disponibilité (63,6%), le type d'acte (57,9%) et les allergies (43,9%) (Figure 3).
- Le critère de choix principal des IDE est le type d'acte réalisé, des médecins la disponibilité du gant dans le service, des sages-femmes les allergies (patients ou soignants) et le confort pour les chirurgiens.
- Mise en évidence de mésusage sur certains actes critiques : 19% des participants suivent les recommandations de l'établissement lors de pose de sonde urinaire et d'aspiration trachéo-bronchique, seulement 15 % dans le cas de pose de perfusion sur site implantable.

Figure 1. LE QUESTIONNAIRE





Figure 2. LES PARTICIPANTS

Critère	Nb	Pourcentage
La disponibilité du gant dans le service (type ou taille du gant...)	204	63,6%
Allergie (patient, soignant)	141	43,9%
Le type d'acte réalisé	106	57,9%
La durée de l'acte réalisé	15	4,7%
Le patient (statut sérologique, enfant...)	68	21,2%
Le confort du gant	115	35,8%
Votre habitude	67	20,9%
Votre protection individuelle (si lésion cutanée...)	41	12,8%
Total	321	

Figure 3. LES CRITERES DE CHOIX

Discussion – conclusion :

Une méconnaissance des différents gants médicaux (dénomination, caractéristiques) a été mise en évidence. Une fiche d'information avec les caractéristiques de chaque gant et une actualisation des indications des gants (stériles et non stériles) est diffusée à l'ensemble des services de soins.



GANTS USAGE UNIQUE NON STÉRILES		
Indications	GANTS VINYLE	GANTS NITRILE
	<ul style="list-style-type: none"> Soins infirmiers hors risques AES Allergie (patient, soignant) Manipulation de déchets, linge sale Entretien du matériel et des surfaces souillées Protection mains comportant des lésions cutanées 	<ul style="list-style-type: none"> Soins infirmiers à risque AES Latex en secteur d'endoscopie (manchettes longues)
Conditionnement	Boîte distributrice	
P.U.H.T (euros)	0,017	0,028

GANTS MÉDICAUX STÉRILES				
	GANTS D'EXAMEN	GANTS D'INTERVENTION	GANTS CHIRURGICAUX	
Caractéristiques	Manchette courte	Manchette longue anatomique	Manchette longue anatomique	
Conditionnement	Unitaire	Par paire	Par paire	
Matériaux	Latex poudré	Latex non poudré	Latex poudré Latex non poudré Sans poudre sans latex	
Indications au CHU	• Aspiration trachéo-bronchique	• Geste aseptique hors bloc opératoire	• Geste aseptique en bloc opératoire et salle interventionnelle • Allergie soignant ou patient au latex • Population pédiatrique	
Matériaux	Latex poudré	Latex non poudré	Latex poudré	Latex non poudré Sans poudre sans latex
P.U.H.T (euros)	0,146	0,245	0,29	0,35 0,904