Sous-traitance et préparation en urgence des médicaments cytotoxiques : comment accompagner les services de soins ?

J. Nguyen, A. Destable-Nicolau, S. Drouot, S. Perier-Raspaud, A-M Taburet, C. Le Tiec
Pharmacie, HUPS Bicêtre, 94200 Le Kremlin Bicêtre

Introduction et Objectifs

La sous-traitance des chimiothérapies au sein de notre établissement a nécessité la mise en place d'une alternative pour les situations d'urgences le week-end et les jours fériés. Dans ce contexte, l'utilisation du Dispositif de Transfert Sécurisé en Système Clos (DTSSC) BD PhaSeal™ a été instaurée dans les services de soins. Ce dispositif permet de répondre à ces situations mais aussi aux demandes réalisées pour d'autres médicaments cytotoxiques, hors chimiothérapies. Ce travail a eu pour objectif d'établir des recommandations afin de promouvoir le bon usage du DTSSC, en fonction du médicament cytotoxique à reconstituer en urgence, dans l'ensemble de l'établissement.

Matériels et méthodes

La promotion du bon usage du DTSSC a nécessité le recueil d'un certain nombre de données présentées ci-après et a conduit dans un même temps à la réalisation de formations. L'étude des données obtenues a ainsi permis l'élaboration de documents mis à disposition des différentes équipes.

- Réalisation d'une analyse des consommations des médicaments cytotoxiques les plus utilisés.
- Détermination des références du DTSSC compatibles pour chaque médicament.

Organisation de formations pratiques au sein des services de soins. Ces formations se sont déroulées sur 2 jours avec le laboratoire fournisseur du DTSSC.

Résultats et Discussion

8 molécules cytotoxiques ont été retenues dans le cadre de l'utilisation de DTSSC suite à l'extraction des consommations.

1 tableau synthétique

Ce tableau présente pour chaque médicament cytotoxique les différentes références du DTSSC BD PhaSeal™ nécessaires. Il a été établi en fonction des caractéristiques de ces médicaments et des données fournies par la société du DTSSC (volumes de dilution, solvant de dilution, diamètre de l'opercule...).

Modalités de préparation avec les dispositifs sécurisés BD PhaSeal™

Caractéristiques du principe actif	Principe Actif							
	Mitomycine AMEYTOCINE 40mg Sanofi	Bléomycine 15mg Sanofi	Cyclophosphamide ENDOSLAN 1000mg Baxter	Etoposide 100mg/5ml Mylan	MTX 5mg/2ml Mylan	Bortezomib VELCADE 3,5 mg Janssen-Cilag	Mycophénolate CELCEPT 500mg Roche	Ganciclovir CYMGAR 500mg Roche
Volume de reconstitution	40mL	5mL	50mL			3,5 mL	14mL	10mL
Solvant de reconstitution	NaCl 0,9%	NaCl 0,9%	NaCl 0,9%	PRÉT A L'EMPLOI	PRÉT A L'EMPLOI	NaCl 0,9%	05%	Eau PPI
Conditionnement Solvant dilution / Volume	SERINGUE (par de dilution)	SERINGUE (par de dilution)	POCHE NaCl 0,9% 250 - 500 ml	ROCHE NaCl 0,9% ou 05% 250 ou 500 ml	SERINGUE (par de dilution)	SERINGUE (par de dilution)	POCHE (max 10 mg/ml)	POCHE NaCl 0,9% ou 05% (max 10 mg/ml)
Posologie	40 mg isem	15 mg (Mabade Atréno Verneuse (BVA))	250 à 3000mg/m2	50 à 150 mg/m2 x 1 à 3	1 mg/m2 (grossesse extra utérine)	1,3mg/m2	1g x2/jour	De 6 mg/kg à 5 mg/kg/12h
Voie d'administration	Endoveineuse	IV, IV lente IM ou SC	IV (30mn-3h)	IV lente (1-1h)	IM ou In Situ (coelie)	IVD	IV lente (2h)	IV lente
Composant PHASEAL	Injecteur® N35	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)	x1 (par seringue)
	Protecteur®	P50 (1 par flacon)	P21 ou P50 (1 par flacon)	P50 (1 par flacon)	P21 ou P50 (1 par flacon)	P14 (1 par flacon)	P14 (1 par flacon)	P21 ou P50 (1 par flacon)
	Connecteur C35	x1	x1			x1	x1	
	Adaptateur perfusion® C100	x1 (par poche)	x1 (par poche)	x1 (par poche)	x1 (par poche)	NON (SERINGUE)	x1 (par poche)	x1 (par poche)
Divers				x1	x1			x1 (par poche) = 2 au total

- Flacon prêt à l'emploi**
Méthotrexate
Étoposide
- Flacon à reconstituer**
Ganciclovir – Mycophénolate - Bortezomib
Bléomycine - Mitomycine
Cyclophosphamide

81% des services concernés ont reçu une formation pratique avec mise en situation de reconstitution.

2 Fiches techniques accompagnent tout utilisateur, formé ou non :

- 1 fiche pour les médicaments prêts à l'emploi.
- 1 fiche pour les médicaments à reconstituer.

Elles sont dichotomisées selon le mode d'administration du produit (poche ou seringue).

Côté face : liste du matériel à préparer pour la protection individuelle et la reconstitution du cytotoxique. Les différentes phases de la reconstitution sont ensuite détaillées par étapes.

Côté recto : dédié aux modalités de manipulations des médicaments cytotoxiques. Elle rappelle la conduite à tenir en cas d'incident et la gestion de l'élimination des déchets cytotoxiques dans les services de soins.

Conclusion

La mise en place du dispositif de transfert sécurisé en système clos BD PhaSeal™ permet la reconstitution sécurisée des médicaments cytotoxiques dans les services de soins. Son déploiement nécessite un accompagnement pharmaceutique, notamment par la mise à disposition de documents tels que des fiches techniques.

Afin de pérenniser une telle démarche, une évaluation de son impact devra être réalisée et d'éventuelles mesures correctives mises en place.