

VERS UNE MEILLEURE UTILISATION

Pham B.N.¹, Morandat L.², Bataillard G.¹, Kerhoas A.¹, Pivot C.³

¹ CAMSP, ² Service Hygiène, ³ Service Pharmacie, Hôpital E. Herriot, 5, place d'Arsonval, 69437 Lyon Cedex 03

INTRODUCTION/OBJECTIFS :

Trois pansements pour voies veineuses périphériques (VVP) sont disponibles sur l'établissement :

- Véca-C®, sans bandelettes autocollantes (strips)
- Tegaderm 1633® avec strips fournis
- Et un dernier réservé à la pédiatrie.

Nous fournissons les services en sutures cutanées et une évaluation des pratiques à la suite du référencement du pansement Tegaderm 1633 ® s'est avérée nécessaire.

METHODE :

Établissement d'un questionnaire à destination des services « poseurs de VVP », permettant d'évaluer le pansement utilisé, son indication, et de quelle façon (utilisation de strips ou non).

Par ailleurs, évaluation de 2 points critiques des soins de VVP (temps de pose et fréquence de changement du pansement).

RESULTATS/DISCUSSION :

•140 questionnaires remplis.

•Utilisation étendue de sutures cutanées avec le pansement n°1 :

•**66%** de ces pansements sont posés avec rajout de sutures cutanées de manière **systématique ou occasionnelle**. Cependant, seuls 2 strips sur les 4 contenus dans un paquet sont utilisés. Les 2 strips restants étant jetés dans 1 cas sur 2.

•En parallèle, seuls **30%** des « poseurs de VVP » utilisent le pansement n°2 (avec strips).

→ Coût :

•L'association pansement n°1 et sutures cutanées revient **2 fois plus cher** que le pansement n°2 .

→ Satisfaction : les 2 pansements sont comparables (décollement peu fréquent).

→ **Soins** : le changement du pansement est bien réalisé selon les recommandations, c'est-à-dire en cas de souillure ou de décollement de celui-ci. Par contre, encore le **1/3 des IDE** déclare encore changer la VVP au bout de **72 heures**, malgré le passage de cette limite à **96 heures**, en dehors de la survenue de signes d'infection.

CONCLUSION :

Le manque d'utilisation du pansement Tegaderm 1633 ® était lié à une méconnaissance du matériel disponible sur l'établissement, par défaut de diffusion de l'information, suite à son récent référencement.

La communication entre les services est essentielle dans un établissement de soins.

L'affiche ci-après a été présentée en réunion de correspondants d'hygiène, pour diffusion. Elle est en cours d'impression pour affichage dans chacun des offices infirmiers.

Le pansement Tegaderm 1633® a été rajouté dans les bons de commande standard de matériel des unités de soins.

SERVICE : _____ CODE : _____ CODE spécialisée : _____
DATE : _____ ENQUÊTEUR : _____

ENQUÊTE SUR LA FIXATION DES CATHETERS COURTS (VVP)
HÔPITAL EDOUARD HERRIOT
Objectif : Définir le pansement le plus adapté à chaque besoin.

1. Quel type de pansement posez-vous pour une VVP ?
☐ Transparent (Tegaderm 1633®)
☐ Semi-transparent (Véca-C®) ou Non-transparent (Véca-Fix®)

2a. Utilisez-vous des bandelettes (ou strips) pour la fixation des ailettes ?
☐ OUI de manière systématique
☐ OUI parfois, selon les cas. Précisez dans quels cas : _____

☐ NON

2b. Si OUI, de quel type :
☐ Steristrip®
☐ Bandelettes stériles fournies dans le Tegaderm®
☐ Les 2 si besoin

3a. Utilisez-vous des bandelettes (ou strips) pour la fixation du prolongateur ?
☐ OUI de manière systématique
☐ OUI parfois, selon les cas. Précisez dans quels cas : _____

☐ NON

3b. Si OUI, de quel type :
☐ Steristrip®
☐ Bandelettes stériles fournies dans le Tegaderm®
☐ Les 2 si besoin

4. En cas d'utilisation de Steristrip®, que faites-vous du paquet de pansement entamé ?
☐ Jeté à la poubelle
☐ Conservé puis réutilisé
☐ Autre : Préciser : _____

5. Le pansement se décolle-t-il ?
☐ OUI parfois
☐ OUI souvent
☐ NON

6. Quand changez-vous le cathéter ?
☐ Au bout de 72 heures
☐ Au bout de 96 heures
☐ Autre : Préciser : _____

7. Quand changez-vous le pansement ? (plusieurs réponses possibles)
☐ Au bout de 72 heures
☐ Au bout de 96 heures
☐ S'il est décollé
☐ S'il est souillé
☐ Autre : Préciser : _____



QUEL PANSEMENT POUR FIXER UNE VVP ?

VECA-C sans strips	TEGADERM 1633 avec strips inclus	TEGADERM PEDIATRIQUE
Si fixation des ailettes non nécessaire ou si VVP en place < 24 heures	Si fixation des ailettes nécessaire ou si VVP en place > 24 heures	En pédiatrie
		
FIXER LE PROLONGATEUR ET LA TUBULURE AVEC DU SPARADRAP		
ENTRETIEN/SOINS		
-Changement du pansement s'il est souillé ou décollé.		
-Changement du cathéter toutes les 96 heures ou avant si signes d'infection.		
Prolongation au-delà de 96h sur prescription médicale		

Octobre 2007 CAMSP/Unité d'hygiène H4H