


ENQUETE SUR LES PRATIQUES DE PERFUSION AU CHU DE TOULOUSE

Degrès E¹., Lapeyrade A¹., Rouves N.¹, Skinazy M.C.¹, Lucido A.¹, Canonge J.M.¹, Lafont J.¹, Thiveaud D.¹
¹ Pôle Pharmacie, CHU de Toulouse

Introduction :


La perfusion est un acte de soin réalisé quotidiennement par les équipes soignantes mais qui peut être source d'incidents en cas de mauvaise utilisation des dispositifs médicaux. En collaboration avec la direction des soins infirmiers, la pharmacie du CHU de Toulouse a décidé de réaliser une évaluation des pratiques de perfusion.

Méthodologie :



Résultats :

18 infirmières observées et interrogées :
 9 en hématologie et 9 dans le service des maladies infectieuses



Infirmière dépendant : exemple pour le choix de la ligne de perfusion en 1ère intention

Service dépendant : exemple pour le rythme de changement des tubulures

unité 1 d'hématologie	1 fois par semaine
unité 2 d'hématologie	toutes les 24h
unité 3 d'hématologie	toutes les 72h
SMIT	toutes les 24h

Pratiques hétérogènes

Réglage du débit non-conforme par rapport aux bonnes pratiques

Pas de vérification du débit 15 minutes après la pose du perfuseur, ni 1 heure après

Intérêt pour participer à un groupe de travail

11 infirmières sont intéressées pour faire partie d'un groupe de travail

Conclusion :

Ce travail va déclencher une procédure d'amélioration des pratiques de perfusion au sein du CHU. Une collaboration pluridisciplinaire entre la direction des soins infirmiers, les équipes de soin et la pharmacie paraît indispensable.