

ÉVALUATION DU BON USAGE DES STENTS VASCULAIRES PÉRIPHÉRIQUES À L'HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU


Niel J, Martelli N, Navasse A, Prognon P, Pineau J.

Hôpital Européen Georges Pompidou - Service Pharmacie, 20 rue Leblanc - 75015 Paris


Introduction

En 2005, le Comité de la « Juste Prescription »¹ (JP) de l'Île-de-France a établi des recommandations relatives au bon usage des **stents vasculaires périphériques**. Ces dernières s'ajoutent à celles inscrites dans la **Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR)**.

Afin d'évaluer le respect de ces deux référentiels, une **étude rétrospective** sur 18 mois a été menée dans le **service de radiologie vasculaire interventionnelle** de l'Hôpital Européen Georges Pompidou.




Matériels et méthodes



Résultats

A. Résultats généraux

Au total, l'étude sur 18 mois a recensé **642 stents** implantés chez **423 patients**, soit une activité de pose de plus de 35 stents/mois.



Répartition des stents par site de pose (fig. 1)

B. Répartition des indications selon les référentiels



Répartition des stents selon les groupes de la JP (fig. 2)

La prise en charge financière est assurée, selon les indications définies par l'Assurance Maladie, dans la limite d'une unité au maximum, par artère, à l'exception du traitement des sténoses de l'artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris en charge.

- ☞ Parmi les **202 stents** dont les indications ne sont pas répertoriées dans les groupes de la Juste Prescription (Hors groupes), la moitié (**105 stents**) concerne des **indications intégrées à la LPP** (code et indication).
- ☞ Par contre, **97 stents** correspondent à des situations (sites ou indications) prévues ni par la Juste prescription ni par la LPP.

Discussion-Conclusion



- ☐ Le nombre élevé d'implantations hors groupes (31%) montre la nécessité de mettre à jour régulièrement les référentiels, afin d'intégrer au mieux l'évolution des techniques et des dispositifs disponibles. La **création d'un groupe IV**, à l'instar du médicament, permettrait d'intégrer les indications en devenir.
- ☐ D'autre part, ces résultats illustrent la difficulté de travailler avec 2 référentiels. L'élaboration et la mise à jour régulière d'un **référentiel national unique** paraissent indispensables.

Référence bibliographique

¹ Endoprothèses pour le traitement endovasculaire des lésions des artères périphériques dits « stents périphériques ». Site Juste prescription <http://jprescription.aphp.fr> Version du 2 novembre 2005.