

Enquête de pratiques de la prise en charge des plaies: Impact de la création d'un Groupe Plaies et Cicatrisation

M. Sauvageon¹, E. Bezian¹, S. Gnamien-Clermont¹, M.C. Gauthier², B. Cottard-Boulle³, F. Espinasse³, E. Mahé²
Service de Pharmacie¹, Service de Dermatologie², Equipe opérationnelle d'hygiène³ - CHU Ambroise Paré (AP-HP), Boulogne Billancourt

OBJECTIFS

- Analyser la prise en charge des plaies au sein de l'établissement
- Comparer les données recueillies lors de la première enquête de pratiques professionnelles (EPP) en 2008
- Evaluer l'impact de la création d'un Groupe Plaies et Cicatrisation (GPC) et des mesures correctrices mises en œuvre sur les axes d'amélioration identifiés


MATERIELS ET METHODES

- Enquête de type « un jour donné » en juin 2010 (même méthodologie que celle de 2008),
 - Auprès de tous les patients hospitalisés, à l'exception des patients d'hôpital de jour, des lits-porte, de la salle de réveil et du centre de dialyse
 - Examen intégral des patients par un binôme d'enquêteurs préformés
 - Recueil des observations : **Formulaire d'enquête**, validé par le groupe de travail lors de la 1^{ère} EPP
- ➡ Items : démographiques, descriptifs des plaies et des soins, prescriptions et suivi des plaies

RESULTATS

225 patients dont 193 patients examinés
48% porteurs de plaies soit 249 plaies

Comparaison 2008 - 2010



Le GPC (constitué de médecins, pharmaciens, et infirmières) a permis :

- la rédaction de référentiels
- la mise en place d'actions de formation
- la rédaction de «fiches pansements» communes pour le dossier de soin

DISCUSSION

Amélioration de la qualité de la prise en charge des soins des plaies

TYPE DE PLAIE	OBJECTIF	ACTION	PANSEMENT PRIMAIRE	PANSEMENT SECONDAIRE	FREQUENCE DE CHANGEMENT
NECROSE SECHE	DETERSION	DETERGER (débouill, curette) ou PARALLER (Hydrogel ou Vaseline)	Hydrogel Vaseline	Film transparent ou Hydrocolloïde mou	48 heures ou à saturation
NECROSE HUMIDE	DETERSION	DETERGER (débouill, curette)	Peu d'exsudat : HYDROCOLLOÏDE HYDROCOLLOÏDE PANSEMENT INTERFACÉ	Compresses séchées ou Pansement absorbant type « Américain »	48 heures ou à saturation
PLAIE FIBRINEUSE	DETERSION	DETERGER (débouill, curette)	Peu d'exsudat : HYDROCOLLOÏDE HYDROCOLLOÏDE PANSEMENT INTERFACÉ	Compresses séchées ou Pansement absorbant type « Américain »	48 heures ou à saturation
PLAIE BOURGEONNANTE	BOURGEONNEMENT	BOURGEONNEMENT	Peu d'exsudat : HYDROCOLLOÏDE HYDROCOLLOÏDE PANSEMENT INTERFACÉ	Compresses séchées ou Pansement absorbant type « Américain »	48 heures ou à saturation
EROSION	EPIDERMISATION	EPIDERMISATION	Peu d'exsudat : HYDROCOLLOÏDE HYDROCOLLOÏDE PANSEMENT INTERFACÉ	Compresses séchées ou Pansement absorbant type « Américain »	72 heures ou à saturation

CONCLUSION

Les résultats encore modérés peuvent s'expliquer par le caractère récent du GPC et l'importance des améliorations à mener de front. Des actions, notamment de formation et d'information, sont programmées afin de consolider la dynamique créée.