

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DU SYSTEME VAC AU CHU DE BORDEAUX DE 2007 A 2009



S.Yani¹, C.Humaraut¹, C.Morgat¹, I.Maachi¹, V.Philip¹

1. Pharmacie des dispositifs médicaux stériles Hôpital Haut Lévéque Avenue de Magellan 33600 Pessac

Introduction :

La prise en charge des plaies aiguës et chroniques par pression négative s'est considérablement développée ces dernières années. Fin 2005, le CHU de Bordeaux a commencé à traiter des patients atteints de plaies complexes et sévères par cette thérapeutique innovante qui s'est peu à peu développée et rapidement imposée comme thérapeutique de référence pour certaines plaies.


Objectifs :

L'objectif de ce travail est d'évaluer l'évolution des consommations du système VAC (Vaccum Assisted Closure) sur 3 ans, compte tenu du coût élevé de cette thérapeutique et ce afin de prévoir les possibilités de financement.


Matériels et Méthode :

Sur une période de 3 ans, la dispensation nominative du système VAC nous a permis de recueillir différentes données dont celles concernant le nombre de patients traités, les consommables délivrés et les durées de traitement.


Résultats et Discussion :



Nombre de Patients traités par système VAC



Coût du système VAC/Patient (euros)



Le nombre de patients augmente chaque année avec une très nette augmentation de plus de 50% entre 2007 et 2008. Cependant, pendant cette même période, les dépenses liées au VAC n'ont augmenté que de 25%. Cet écart laisse entendre une meilleure utilisation des consommables et une optimisation de la durée de traitement (-11% entre 2007 et 2009). Entre 2008 et 2009, on note en revanche une augmentation du coût par patient (+7%) malgré une stabilité de la durée de traitement expliquée par l'introduction de nouveaux consommables plus coûteux (mousses XL ou blanches, Infovac 1L...) dont il convient de limiter les utilisations.

Conclusion :

Depuis 2007, nous constatons donc une forte augmentation de l'utilisation du système VAC. Etant donné le coût non négligeable de cette thérapeutique, ceci justifie de maintenir le contrôle par le pharmacien du respect des indications et des durées de traitement. Dans le cadre d'une amélioration de la qualité des soins apportés au patient, il se doit aussi d'insister sur la formation et l'information du corps médical sur l'utilisation optimale de cette thérapeutique.