

Pérennes M, Donval I, Le DU I, Balcon C, Borgnis-Desbordes N. Service CAMSP- CHRU BREST.

INTRODUCTION

La question de l'introduction des gants non stériles de type « vinyle-stretch » dans notre établissement nous a amené à réaliser en 2009 une enquête dans les services de soins sur l'utilisation des gants d'examen. Deux enquêtes similaires avaient été menées en 1998 et 2001 suite à la création d'un groupe de travail sur l'utilisation des gants et à la diffusion de recommandations au personnel soignant.

MATERIEL ET METHODES


- ★ Création d'une grille de recueil portant sur 14 gestes courants.
- ★ Diffusion aux infirmiers diplômés d'état (IDE), aux aides soignants (AS) et aux agents des services hospitaliers (ASH) de l'ensemble des services de notre établissement.
- ★ Recueil des données et comparaison avec les résultats obtenus en 1998 et 2001.
- ★ Evaluation du respect des protocoles portant sur l'utilisation des gants d'examen.

RESULTATS

27 services ont répondu à l'enquête. 246 feuilles ont été recueillies (76 AS/ASH et 170 IDE)

Prélèvements sanguins (IDE)

Geste à risque élevé de contamination nécessitant le port de gants d'examen (vinyle ou latex)




Evolution des pratiques entre 1998 et 2009

➡ Forte progression du port de gants latex

Manipulation de déchets à risque (IDE, AS, ASH)

Geste nécessitant le port de gants vinyle




Evolution des pratiques entre 1998 et 2009

➡ Port des gants vinyle respecté (en augmentation)


Toilette du patient, hors zone génito-anale (IDE, AS, ASH)

Geste ne nécessitant pas le port de gants sauf cas particuliers (patient infecté)



Evolution des pratiques entre 1998 et 2009

➡ Pas de variation des résultats : port des gants vinyle trop fréquent



Résultats détaillés 2009

➡ Résultats obtenus identiques pour les IDE et les AS/ASH

CONCLUSION

Ces résultats ont été présentés au CLIN de notre établissement. Notre enquête a mis en évidence un impact certain des recommandations émises au cours des dix dernières années sur les pratiques dans les services de soins, même si certains points peuvent encore être améliorés. L'utilisation trop importante des gants latex par le personnel soignant pour certains gestes nous a amené à introduire en 2010 les gants vinyle stretch dans deux services pilotes en remplacement des gants d'examen vinyle et latex.