

Gorgeon C.*, Ballihi N.**, Teteau C.**, Juis J.***, Brischoux S.*, Javerliat M.*

*Pharmacie à Usage Intérieur - **Service de Chirurgie Digestive et viscérale - ***Service de Chirurgie Urologique
CHU Dupuytren – Pharmacie centrale – 2, avenue Martin Luther King – 87042 Limoges Cedex
sonia.brischoux@chu-limoges.fr

INTRODUCTION

Environ 110 000 personnes sont stomisées en France. La stomathérapie nécessite des connaissances spécifiques et des soins particuliers afin d'assurer un confort optimal pour le patient lors de son hospitalisation mais aussi pour l'aider à gérer lui-même sa stomie. Une bonne gestion de la stomie est primordiale pour le bien être des patients afin de leur permettre de continuer à exercer une vie professionnel, de faire du sport, voyager et conserver une vie sociale et familiale satisfaisante.

MATERIELS ET METHODES

Suite à l'observation d'un manque d'informations du personnel infirmier des services de soins, il a été créé un groupe de travail pluridisciplinaire pour mettre en place des fiches de bon usage concernant les stomies. Le groupe est composé de stomathérapeutes, cadres de santé, infirmiers et pharmaciens.

RESULTATS

Pharmacie à usage intérieur | Demande de poche étou support pour stomie | PUI E01 DMS001 A | Septembre 2011 | Page 1/1

Date de demande: _____ Tampon UF

Prescripteur (nom et signature): _____

Vous avez les références:
 - Poche: Référence: _____ Fournisseur: _____
 - Support: Référence: _____ Fournisseur: _____

Vous n'avez pas les références: merci de donner les renseignements suivants

Stomie digestive
 - Colostomie: Type de poche: (1) Poche fermée (si selles mouillées) (2) Poche vidable (si selles molles ou liquides)
 - Diamètre de la stomie: _____ mm
 - Appareillage: (1) 1 pièce (2 changements maximum par jour) (2) 2 pièces: (1) adhésif ou (1) à embollement (+ à digestif)

Stomie urinaire
 - Appareillage stérile avec fondible (si néphrostomie permanente ou fistule en post-opératoire immédiat): précisez le diamètre (50, 75 ou 100mm): _____ mm
 - Appareillage non stérile: poche vidangeable: Diamètre de la stomie: _____ mm
 - Appareillage: (1) 1 pièce (2) 2 pièces: (1) adhésif ou (1) à embollement (+ à digestif)

**ordonnance spécifique
détaillée → aide pour les
prescripteurs et les
infirmiers dans le choix de
l'appareillage + commande
par la pharmacie**



**En annexes : les différents
types de stomies urinaires
et digestives**

**Documents pédagogiques
à destination des infirmiers
et prescripteurs**

**Création de
4 documents
qualités
+ 2 annexes
+ 1 ordonnance**

**Validés par
les chirurgiens
digestifs et urologues**

**Différents type
d'appareillage
en fonction de
la stomie**

**Recommandations pour les
soins des stomies et le
changement de l'appareillage
en fonction du type utilisé**

Pharmacie à usage intérieur | Soins de stomie urinaire | PUI E01 SP032 A | Février 2012 | Page 1/4

Prescripteur: D. S. Brischoux, J. Juis, C. Lambert-Hélary, N. A. Deschamps
 Vérificateur: M. Juis, C. Lambert-Hélary, N. A. Deschamps
 Approuvé par: M. Juis, C. Lambert-Hélary, N. A. Deschamps


Patient autonome pour les soins: Prévoir un contact avec le pharmacien. Lire les recommandations générales.

Recommandations générales

- Une stomie est une plaie: elle doit être soignée et traitée comme telle.
- Le soin est à réaliser tous les jours, ou à tout moment en cas de fuite.
- Ne pas utiliser sans avis médical: l'acétone, l'alcool et les produits abrasifs.

II. Rythme de changement du matériel

- Appareillage avec ur support: 1 pièce
- Changement: en la poche: tous les jours
- Changement: du support: (selon recommandations fabricant) ou à l'expiration de la durée de validité
- Appareillage avec ur support: 2 pièces
- Changement de la poche: tous les jours
- Changement du support: tous les 2 jours maximum



Appareillage pour stomie digestive | PUI E01 DMS001 A | Septembre 2011 | Page 1/1

Appareillage pour stomie urinaire | PUI E01 DMS001 A | Février 2012 | Page 1/1

Document donnant des recommandations générales à adapter selon les affluents. Validé de la pharmacie à usage intérieur.

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'APPAREILLAGE

- Stomie 1 pièce**: Contient un support hydrocolloïde (adhésif) et une poche à coller ou à clipser sur le support.
- Stomie 2 pièces**: Contient un support hydrocolloïde (adhésif) et une poche à coller ou à clipser sur le support.
- Stomie 3 pièces**: Contient un support hydrocolloïde (adhésif) et une poche à coller ou à clipser sur le support.

CHOIX DE L'APPAREILLAGE EN FONCTION DU TYPE DE STOMIE

- REGISTOMES, COLOSTOMES PROXIMAUX ET COLOSTOMES TRANSVERSES**: Poche 1 pièce.
- COLOSTOMES CAECAUX ET TERMINALES**: Poche 1 pièce.
- POCHE VIDABLE**: Poche vidable possible en post-opératoire immédiat (7 premiers jours) ou en cas de stomie.

urinaires

digestives

DISCUSSION, CONCLUSION

Tous ces documents, disponibles sur l'intranet, permettent d'aider le personnel soignant à mieux comprendre les stomies et à mieux appréhender le patient stomisé. De plus, le lien avec la pharmacie est facilité grâce à la présence d'une ordonnance spécifique qui guide le prescripteur afin de renseigner toutes les informations nécessaires pour le choix d'appareillage lorsque la référence exacte est inconnue. Cependant, la présence d'un stomathérapeute, personnel spécialisé dans les stomies, reste indispensable afin de prendre en charge les stomies difficiles et de former de façon pratique le personnel soignant afin de les aider au mieux dans leurs soins quotidiens.