



INTRODUCTION

Lors des débranchements de FAV, le risque hémorragique est important. Au CHU de Limoges, devant l'absence de recommandations officielles, l'utilisation des pansements hémostatiques n'était jusqu'alors pas encadrée.

OBJECTIFS


Evaluer les pratiques actuelles de compression et d'utilisation des pansements hémostatiques lors des débranchements de FAV au sein des services d'hémodialyse et de néphrologie.

MATERIELS ET METHODES

RESULTATS

Retour de 247 fiches complétées (soit 61 patients)

Points critiques	Actions correctives
 Répartition du type de technique de compression utilisé *17 cas d'utilisation d'une compresse simple en présence d'un saignement *64 cas d'utilisation d'un pansement hémostatique en absence de saignement *dotation comportant 2 pansements différents à base d'alginate de Ca²⁺, dont TIPSTOP® utilisé à 100 % avec des pinces mécaniques → intérêt par rapport aux compresses d'alginate de Ca²⁺? *utilisation du PANGEN® (pansement de collagène, résorbable, à visée plutôt chirurgicale) Désinfection locale de la peau non renseignée dans 44 % des cas	Rappels sur les avantages de la compression manuelle patient et à défaut soignant → expliquer et proposer aux patients aptes, garder la compression mécanique en dernier recours) (protocole BP) Diagramme décisionnel du choix du pansement en fonction du risque hémorragique (protocole BP) Prescription médicale nominative obligatoire pour l'utilisation de pansements hémostatiques en systématique Réajustement de la dotation de pansements hémostatiques disponibles : -TISTOP® réservé aux patients habitués -PANGEN® supprimé de la dotation -conservation des compresses d'alginate de calcium Rappels sur la nécessité de réaliser une désinfection locale de la peau au niveau du point de ponction (protocole de BP)



Protocole de BP




Diagramme décisionnel

DISCUSSION-CONCLUSION

Cette étude a permis d'encadrer l'utilisation des pansements hémostatiques et de définir les bonnes techniques de compression. Cependant, il faudra réévaluer les pratiques à posteriori afin d'évaluer l'impact de notre action tant au niveau des bonnes pratiques qu'au niveau économique. Ce travail a été intégré dans le programme PHARE.