ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES POST-OPÉRATOIRES: MISE EN PLACE ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Misandeau Q. 1, Archer V. 1, Pidet O. 2, Tortolano L. 1, Paul M. 1

- 1 Pharmacie, groupe hospitalier Henri Mondor, 94000 Créteil
- 2 Chirurgie orthopédique et traumatologique, groupe hospitalier Henri Mondor, 94000 Créteil

valerie.archer@aphp.fr Mots clés : prothèse genou, questionnaire, livret



Suite à une arthroplastie totale du genou, afin « d'aider le patient à développer des compétences » 1, il a été décidé :

- > De rédiger en groupe multidisciplinaire, un livret composé de 4 parties : votre prothèse de genou, votre prise en charge à l'hôpital et au domicile, les complications possibles et les gestes du quotidien. Celui-ci a été validé par la Comedims.
- > De mettre en place des entretiens pharmaceutiques.




OBJECTIFS

Evaluer l'impact des entretiens pharmaceutiques

Deux questionnaires à choix multiples (QCM) ont été proposés aux patients après l'opération :

- d'évaluation QCM √ Un des compétences avant après l'entretien mené par l'interne en pharmacie
- ✓ Un QCM de satisfaction du livret et de l'entretien.



- > 24 heures au moins après l'opération :
- 1. Evaluation des compétences de base par QCM
- 2. Entretien avec présentation du livret
- 3. Remise du questionnaire de satisfaction

• → Avant la sortie d'hospitalisation :

- 1. Evaluation des compétences acquises avec ce même QCM
- 2. Correction du QCM avec le patient
- 3. Récupération du questionnaire de satisfaction


RÉSULTATS


Sur 24 entretiens en 2 mois, 17 ont été inclus dans l'étude.


Sept patients ont été exclus : 5 ne lisent pas le français et 2 pour troubles mnésiques.

Population inclue : 70% de femmes / 67±7 ans / 100% de gonarthrose / 23% d'entre eux avaient déjà une PG

(tricompartimentale = 16 / unicompartimentale = 1).







- ✓ Les entretiens et le livret apportent des notions adaptées et claires, bien assimilées par le patient.
- ✓ L'intérêt au long court de ces entretiens pourrait être évalué par le taux de ré-hospitalisation à 6 mois.
- ✓ Ces résultats positifs doivent être confortés auprès d'une population plus large incluant des patients présentant des difficultés dans la compréhension du français, avec l'aide de personnes de confiance ou aidant.