




K Stolz¹, J Villain¹, N Ettahar², J Aubert¹, P Drancourt¹, Y Inghels¹, J Boyer¹
¹Pôle Pharmacie, Service des Dispositifs Médicaux Stériles, Centre Hospitalier de Valenciennes
²Unité de maladies infectieuses, CH de Valenciennes, Valenciennes, France

CONTEXTE & OBJECTIF



MATÉRIEL & MÉTHODES

Etude **prospective, comparative & interventionnelle** réalisée en Infectiologie et Endocrinologie

Phase d'observation (8 mois)
PEC CLASSIQUE

PÉRIODE DE WASH OUT

Phase de conciliation (6 mois)

PEC CLASSIQUE + CONCILIATION

- Entretien & éducation patient
- Analyse des ordonnances et IP
- Informations des professionnels de ville

- **Questionnaire téléphonique de 37 questions** auprès du patient, prestataire/HAD et IDE libérale, 7 jours et 1 mois suivant la sortie
- Création de **6 scores** permettant d'évaluer PEC :

 Conformité de l'ordonnance de sortie,

 Connaissances du patient

 Conformité de la continuité des soins d'après le patient

 Conformité de la continuité des soins d'après le PSAD,


 Qualité de la collaboration PSAD/IDE

 Conformité des bonnes pratiques (BP) au domicile,

RÉSULTATS

- Inclusion de 48 patients (24 en d'observation et 24 en conciliation)
- 65% des patients pris en charge par un PSAD et 35% par l'HAD
- 100% sous antibiotiques
- Temps pharmaceutique d'1h30 par patient


AMÉLIORATION STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVE DE LA PEC DES PATIENTS PORTEURS DE PICC LINE PERMIS PAR LA CONCILIATION : 5 SCORES AMÉLIORÉS




34 items abordés sur le PICC :
 - Indications et complications
 - Entretien
 - Impact sur la vie quotidienne

Détails des non conformités des ordonnances en phase d'observation

- Diffuseur optimisable
- Absence de données de stabilité dans le diffuseur
- Mode d'administration inadapté
- Concentration en ATB non conforme
- Concentration en ATB non renseignée
- Solvant non renseigné



Détails des taux de conformités concernant les BP lors des 2 phases



CONCLUSION

Amélioration significative de la PEC des patients porteurs de PICC : optimisation des **connaissances** des patients, de la **conformité des ordonnances** de sortie, de la **continuité des soins** vue par le patient et le PSAD/HAD, et des **BP** au domicile

Face à ces bons résultats et à la demande médicale, un poste de pharmacie clinique DM a été créé. Par la suite, nous souhaitons déployer la conciliation dans **d'autres services** et la diversifier à **d'autres DM**