

INTRODUCTION

- Référencement récent de sondes nasogastriques (SNG) sans guide

2 types de SNG dans l'établissement

- SNG sans guide : Acte infirmier
- SNG avec guide : Acte médical

- Mise en place d'un accompagnement interactif pour les infirmiers (IDE)

OBJECTIFS

- Évaluer les connaissances et les pratiques des IDE sur la pose et l'utilisation des SNG sans guide
- Rappel des règles de bon usage

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Groupe de travail pluri professionnel : deux médecins, un pharmacien, une interne en pharmacie, trois IDE de gastroentérologie, une diététicienne

1. Rédaction d'un questionnaire

- Procédures internes
- Recommandations de la SNFCM*

2. Validation par l'équipe

pharmaceutique, le service
d'hygiène et le CLAN

3. Diffusion du questionnaire

aux IDE

25 février au 08 mars 2019

4. Analyse des résultats et

élaboration d'un atelier
pratique et théorique


RÉSULTATS

1 QUESTIONNAIRE Taux de réponse : 77% soit 64 questionnaires analysés

Réponse attendue

Diffusion aux 6 services les plus utilisateurs Gastroentérologie, Neurologie, Pneumologie, Onco-Rhumatologie, Chirurgie Viscérale, Court Séjour Gériatrique


- BON USAGE ET POSE



Contrôle de la pose de SNG : 92% des IDE font l'auscultation épigastrique avec injection d'air puis une radiologie en cas de doute

- Points critiques à reprendre durant les ateliers : Pose à jeun, 3 points de fixation, contrôle de la pose, carrières des SNG pour le passage des médicaments, le rinçage

- MÉDICAMENTS ET SNG



2 ÉLABORATION D'UN ATELIER DANS LES SERVICES

Déroulement en 2 parties

THEORIQUE

- Différences nutrition entérale et parentérale
- Bon usage de pose et d'utilisation des SNG
- Correction du questionnaire

PRATIQUE

- Pose de SNG sans guide sur un mannequin et sur volontaires
- Partage d'expériences
- Conseils : gestion de l'appréhension de la pose pour les patients et les soignants

Remise d'une **affiche plastifiée** format A3 avec les principaux points abordés

95% des participants « très satisfaits » de l'atelier

DISCUSSION - CONCLUSION

Les ateliers ont été développés avec succès, ils ont permis de confronter les habitudes des différents services avec les bonnes pratiques de pose et d'utilisation des SNG. La fiche de bon usage des SNG sans guide a été diffusée aux services. Pour mesurer l'impact des ateliers, une évaluation des pratiques professionnelles sur la pose des SNG sans guide sera réalisée.

SONDES NASO GASTRIQUES (SNG) SANS GUIDE Règles de Bon Usage



Lien
Bleu CH 8
Gris CH 10
Blanc CH 12

CH 10 minimum si passage de médicaments par SNG
CH 12 si prise des médicaments par voie orale impossible ou réanimation

POSE DE LA SONDE DE NUTRITION ENTÉRALE (NE)

Prescription médicale, acte infirmier
Patient à jeun depuis minimum 6h

Matériel

- Sonde
- Gants à usage unique non stériles
- Verre d'eau + paille ou une compote
- Adhésif hypoallergénique
- Haricot jetable
- Marqueur indélébile

Informez le patient : déroulement de la pose, bénéfices attendus, risques...

Patient en position assise

Estimer la longueur de la sonde
Distance nez-oreille-appendice xiphoïde et ajouter 15-20 cm

Fléchir légèrement la tête vers l'avant et introduire la sonde sans forcer

Quand la sonde est au fond de la gorge, demander au patient de déglutir, le faire boire avec la paille ou lui faire manger une cuillère de compote

Introduire la sonde jusqu'à la longueur estimée

ET APRÈS LA POSE ?

Fixation en 3 points
Nez + Joue + Cou

Contrôle radiologique obligatoire

Repère indélébile (orifice nasale)
Traçabilité dans le dossier patient



MÉDICAMENTS ET SNG

- PASSAGE DES MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE QUAND C'EST POSSIBLE !
- TOUS LES MÉDICAMENTS NE SONT PAS ADMINISTRABLES PAR SNG !
Demander confirmation au pharmacien

Privilégier les galéniques dispersibles ou buvables

AUCUN MÉDICAMENT DIRECTEMENT DANS LA POCHE DE NUTRITION

Administration directement dans la sonde : un seul médicament à la fois, rincer avant et après administration (attention à la quantité d'eau)

POINTS ESSENTIELS

- Contrôle du positionnement de la sonde avant chaque utilisation (à l'aide du repère)
- Arrêter la nutrition lors des soins et pendant les mobilisations
- Changement de tubulure entre chaque poche de nutrition

PRODUITS DE NE

Type Sondalis® ou Fresubin®
Standard
Energy Fibres
HP Energy
HP Energy Fibres
T Energy