



PRISE EN CHARGE DE LA PRÉCARITÉ À L'HÔPITAL : QU'EN EST-IL DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ?



Martin Anne-Sophie¹, Noailly Julie¹, Perrinet Marie¹, Bourdon Olivier^{1,2}

¹ Pharmacie à usage intérieur, Hôpital Robert Debré, 75019 Paris; ² Faculté de Pharmacie, Université de Paris 75006 Paris

N°15

Depuis plusieurs années, le nombre de patients en situation précaire accueillis à la PUI, est en forte augmentation. Les ordonnances comportent essentiellement des médicaments mais des dispositifs médicaux (DM) sont de plus en plus prescrits. Des problèmes se posent lors de la dispensation, car le personnel de la PUI ne connaît pas toujours bien les DM prescrits et des substitutions sont parfois nécessaires. De plus, les patients nécessitent des conseils d'utilisation que le personnel n'est pas toujours en mesure de donner, par manque de formation.

OBJECTIFS :

- Faire un **état des lieux des dispensations** de dispositifs médicaux pour **les patients en situation de précarité en 2018**.
- Créer des **fiches pratiques** d'aide à la dispensation et à la substitution de référence si besoin.
- Donner les **conseils associés** à la dispensation des DM.


MATERIEL ET METHODES :

- Recueil **rétrospectif** des ordonnances pour **2018** (Nombre d'ordonnances avec DM, nombre et type de DM prescrits, coût)
- Analyse pour chaque ordonnance des **problèmes rencontrés** (Substitution nécessaire ? Référence disponible au livret ?)

RESULTATS :


Après recueil rétrospectif sur les ordonnances précarité dispensées en 2018

- En 2018, **1772 ordonnances analysées**
- **185 ordonnances avec au moins 1 DM prescrit** - 256 DM prescrits au total
- 856€ en 2014 ; **3 342€** en 2018
- **39,4% des DM prescrits sont des DM pour le diabète de type 1** (Bandelettes, aiguilles...)



Problèmes essentiellement rencontrés en diabétologie :

- **Ordonnances pré-remplies** par les médecins avec prescription de **références non disponibles au livret de l'hôpital** et la mention « non substituable » (sur chaque ordonnance, au moins 2 références ne sont pas disponibles au livret : stylo Fastclix® et coton)
- Bandelettes parfois **non compatibles avec les lecteurs** de glycémie des patients (Il faut donc fournir un lecteur de l'hôpital)
- **Taille d'aiguille** pour stylo à insuline non adaptée à l'âge du patient.
- **Confusion** pour le personnel entre **lancettes et bandelettes**



Types de DM dispensés pour les patients précaires en 2018

Création fiche conseil

Aide à la dispensation

Les dispositifs médicaux de surveillance glycémique et d'insulinothérapie

Dispensation aux patients en situation de précarité (PASS)

1 Prélèvement de sang à l'aide d'une lancette (fine aiguille)

Il est prescrit : Lancettes Fastclix Stylo autopiqueur Fastclix

Je substitue et/ou dispense : Lancettes Unistik 3 (PRELEVEMENT CAPILLAIRE SECURISE (LANCETTE) 30 G 1.5 MM ST (10468904)

Hygiène

• Désinfection cutanée
• Élimination des lancettes, bandelettes, aiguilles dans un collecteur de déchets

Il est prescrit : Coton hydrophile TIPS

Je substitue et/ou dispense : Compresses stériles (COMPRESSE NON TISSE /2 ST 7.5 CM 7.5 CM (10464246))

➔

2 Dépôt de l'échantillon de sang sur la bandelette après insertion dans le lecteur (fourni par le service).
• OU Lecture de la glycémie grâce au capteur posé

Il est prescrit / Je substitue par : Bandelettes mesure glycémie Freestyle ou Accu check / Bandelettes mesure acétone Freestyle / Capteur Freestyle libre

Je substitue et/ou dispense : Bandelettes Freestyle Optium Neo (BANDELETTE SANG FREESTYLE OPTIUM NEO H GLU /100 (10470513)), Bandelettes Optium β cétone (BANDELETTE SANG BETA CETONE OPTIUM NS /50 (10392490)), Bandelettes pour lecteur ACCU-CHEK (BANDELETTE SANG GLYCEMIE ACCU-CHEK NS /50 (10389210)), Capteur Freestyle libre CAPTEUR DE GLYCEMIE FREESTYLE LIBRE (10463216)

3 Pour l'administration d'insuline, fixation d'une aiguille sur le stylo

Enfants < 6 ans et enfants minces : réaliser un pli cutané

Il est prescrit : Aiguille BD micro-fine ultra 4 mm Non sécurisées DM bandées (AIGUILLE STYLO INJECTEUR ST 32 G 4 MM hors marché AGEPS)

Je substitue et/ou dispense : Aiguilles BD micro-fine ultra 4 mm Non sécurisées DM bandées (AIGUILLE STYLO INJECTEUR ST 32 G 4 MM hors marché AGEPS)

Pour les stylos rechargeables d'insuline (STYLO A INSULINE POUR CR PENFILL 3ML 1/2 A 1/2 U/30U NOVOPEN ECHO ROUGE (10356669), NOVOPEN ECHO BLEU (10356820)) : veiller à dispenser le stylo de la couleur prescrite. Pourquoi ? La couleur ne signifie rien pour le laboratoire fabricant mais, lors des séances d'ETP, les infirmier(e)s apprennent au patient à toujours associer un type d'insuline à une couleur de stylo. En cas de moindre doute : contacter un pharmacien (1363).

Conseil associé au DM

• Dépôt d'un échantillon d'urine sur une bandelette spécifique permettant d'analyser la présence ou l'absence de certains composants

Il est prescrit : Bandelettes urinaires Ketostix (3 tests réalisés)

Je substitue et/ou dispense : Bandelettes Multistix 8 SG = 8 tests réalisés (BANDELETTE URINE 8 TESTS NS /100 (MULTISTIX) (10355023))

Photo et référence au livret

Réalisée par Anne-Sophie MARTIN (01 40 03 12 69) - 18 mars 2019

Conclusion :

- ❑ **Augmentation continue de la dispensation de DM** aux patients précaires donc nécessité de connaître les références disponibles à l'hôpital. **Modification des ordonnances à voir avec les médecins, en relation avec le livret thérapeutique.**
- ❑ **Communication améliorée** avec le patient et meilleure prise en charge grâce aux **conseils associés.**
- ❑ Dans le futur, objectif de **création de nouvelles affiches** pour d'autres types de DM (ex des prises en charge des stomies).