

QUAND LA MEDICO-ECONOMIE DIRIGE LA PRISE EN CHARGE !


T. BUSSON¹ (busson.tiffanie@orange.fr), M. JAFFUEL¹, N. SANTOLARIA¹, A. LOISON¹, J-L. BONNEFOUS¹

¹ Service pharmacie, Centre Hospitalier de Bourg en Bresse

Mots clés : Médico-économique, kyste sacro-coccygien, pansement


Introduction :

Prise en charge du kyste sacro-coccygien (KSC) au CH de Bourg en Bresse :



Matériels et Méthodes :

Marqueur d'efficacité : Point de vue : sociétal
Durée de cicatrisation



Coût indirect évalué : Coûts directs évalués :
- Durée arrêt maladie (AM) - Antalgiques (ANTG)
- Pansements (PSMT) - Nombre d'ANTG


Analyse rétrospective et statistique de tous les dossiers (A) et (B) de 2016 à 2019 d'un même chirurgien :

- Age
- Sexe
- Volume pièce opératoire
- Nombre de jour jusqu'à cicatrisation
- Nombre de jour d'AM
- Nombre de consultations
- Nombre de PSMT
- Coût de PSMT
- Nombre d'ANTG
- Coût d'ANTG

Résultats :


Description population

Répartition stratégies chirurgicales (n=61)




	A : Exérèse + cicatrisation dirigée	B : Exérèse + plastie	
Age moyen (an)	26	24	
Sexe (H/F)	81/19%	60/40%	
Volume pièce opératoire (cm ³)	13,4	5,6	P<0,02
Temps opératoire	Identique (70 min)		
Récidive	Identique (négligeable)		


Durées cicatrisation et arrêt maladie (jours)




Moyenne de nombre de consultation jusqu'à cicatrisation



Moyenne des consommables/patient utilisés jusqu'à cicatrisation



Coût consommables/patient jusqu'à cicatrisation



Discussion/Conclusion :

- A :
- Coût total = + 490€/patient
 - Taux de récurrence identique



- B :
- Baisse de 43% de la durée cicatrisation en lien avec un volume exérèse 2,4 fois plus faible
 - Baisse de la consommation de pansements

Les données sont sous-estimées car l'impact économique de la réduction de l'AM n'est pas mesuré et l'amélioration de la qualité de vie est écartée. Les impacts sociétaux et sociaux de cette immobilisation réduite du patient majorent donc l'intérêt d'utiliser la stratégie B.