

Garre G., Lagarde J., Lefrancois A., Hermelin I.
CHR Orléans, Pharmacie

Contexte :

La thérapie par pression négative (TPN) est un adjuvant à la cicatrisation de certaines plaies par l'application d'une pression négative sur celle-ci. Suite à une évaluation rétrospective des pratiques des prescripteurs menée sur l'ensemble des patients traités par TPN, la question de **l'évaluation des pratiques pharmaceutiques** a été posée.

Objectifs : Aider le pharmacien clinicien sur l'analyse pharmaceutique des demandes de TPN, standardiser les pratiques et améliorer la formation.

Matériels et méthode :



Résultats :

1 Révision de l'ordonnance nominative

Ajout :

- Type de traitement (standard, instillation ou détersion instillation)
- Mode de dépression (continu, intermittent)
- Valeur de la dépression (-125 ou -100mmHg)
- Paramètres d'instillation (durée, fréquence..)

Création de 3 outils

2 Fiche d'aide à la validation pharmaceutique des TPN

Standard, instillation ou détersion ?

Standard 0+0	Instillation 0+0+0	Détersion 0+0+0
<p>Dépression au lit de la plaie drainant les exsudats et d'accélération la formation du tissu de granulation</p> <p>● Mousse noire Pour les plaies profondes avec des exsudats modérés à importants</p> <p>Et/ou Mousse blanche Adhérence moindre et résistance à la traction supérieure. Plaies en phase de granulation peu profondes légèrement exsudatives. → A privilégier pour le patient douloureux ou lorsque tendons, fascia, os sont exposés.</p>	<p>Dépression associée à l'administration et l'élimination de solutions topiques permettant le nettoyage de la plaie</p> <p>● Mousse « Veraflo » Mousse aux propriétés hydrophiles supérieures à la mousse classique, permettant d'associer à la pression négative l'administration intermittente de solutions irrigant la plaie. → Donnerait une meilleure efficacité par diminution de la charge du biofilm</p>	<p>Dépression avec instillation conçue pour faciliter l'élimination des exsudats fibrineux, des tissus nécrosés mous et autres charges microbiennes</p> <p>● Mousse « cleanse choice » Association d'un mousse non perforée et perforée permettant d'éliminer le tissu nécrosé → Pour permettre un retrait non chirurgical des résidus fibrino-nécrotiques de la plaie → Pour faciliter l'élimination des éléments infectieux lors d'une initiation</p>

Ne jamais associer mousse standard avec mousse instillation-détersion

3 Fiche de suivi des patients sous TPN

- ✓ Check-list de validation
- ✓ Cotation des interventions pharmaceutiques

Fiche de suivi patient sous TPN

Nom du patient :
Date initiation TPN :/...../.....
Indication - localisation TPN (voir DPP) :

Délivrance n° 1

Check-list

compatibilité entre mousses
 délivrance pour 1S max
 durée prescription < 1mois

Initiales pharmacien :

Date : / /

Type de TPN : Standard (mousse noire mousse blanche / Instillation / Détersion

Intervention pharmaceutique : oui non

Ayant entraîné un appel IDE : oui non / un appel prescripteur : oui non

Description de l'intervention					
Adaptation nbr consommables	Ajout d'un type de consommable	Arrêt d'un type de consommable	Substitution vers une autre mousse	Choix/modé paramètres TPN	Suivi thérapeutique (patient/utilisateur)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Optimisation du montage :

Commentaire libre :

Discussion : Ces outils permettent un meilleur contrôle des délivrances et améliorent le suivi du patient. Cependant, le manque de recommandations par les sociétés savantes limite l'analyse pharmaceutique.

Conclusion :

La mise en œuvre de ces outils aura pour but de contribuer en une **évaluation future des pratiques professionnelles des pharmaciens.**