

W.David¹, P.Boussemart², C.Dewally², P.Bonnet², P.Drancourt¹, J.Boyer¹

¹ Service des Dispositifs Médicaux, ² Service de chirurgie viscérale

CH de Valenciennes, Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes

mots clés: Erreur médicamenteuse, Perfadom, Pharmacie clinique

Introduction et objectifs:

Depuis 2 ans l'équipe pharmaceutique développe la **conciliation** pour les patients porteurs de **Piccline**. L'objectif est d'évaluer l'intérêt d'étendre cette activité en chirurgie en **analysant la conformité des Ordonnances Perfadom** en chirurgie viscérale et définir des axes d'améliorations.

Matériel et méthode:

Elaboration d'une **grille d'audit** par les équipes de Chirurgie viscérale et de Pharmacie.

- **18 critères évalués** : identité (patient, prescripteur), médicament, posologie, voie et mode d'administration, durée.




Recueil et analyse par l'interne de pharmacie des ordonnances Perfadom dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) lors la sortie du patient et **comparaison** au courrier de sortie.

Résultats:

- **40 ordonnances analysées** sur la période de janvier à septembre 2020
- **Toutes les ordonnances Perfadom étaient pré-renseignées par les prestataires de soins à domicile**
- 100% des ordonnances de sortie comportaient un traitement antibiotique
- Durée moyenne de traitement : 12 jours dont 7 jours à domicile

- **Répartition en % des principales erreurs observées**

- **Choix voie d'administration:**


- 1 erreur de voie d'administration a été observée
- 1 divergence d'Antibiotique entre la Perfadom et le DPI relevée
- 4 divergences de posologie (3 sous dosage/ 1 surdosage) par rapport au DPI

Conclusions:

De nombreuses non conformités ont pu être constatées durant cette étude.

En Endocrinologie et aux Maladies Infectieuses, ces mêmes écarts avaient été relevés puis corrigés avec le déploiement de la **conciliation pharmaceutique Piccline**. Le pharmacien apporte son avis d'expert lors de la rédaction des ordonnances, apporte une information spécifique auprès des patients et établit **le lien ville/hôpital**.

Suite à cette étude, un **accord** a été obtenu pour démarrer l'activité de conciliation pharmaceutique dédiée aux patients porteurs de Piccline au sein des différents **services de chirurgie**.