

ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES SUR LE DISPOSITIF MEDICAL: MISE EN PLACE EN SERVICE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE APRES UNE POSE DE STENT CORONAIRE

A.AITGOUGAM; P.COSTE; T.COUFFINHAL; A.FRESSELINAT Mots clés: dispositif médical implantable; besoins éducatifs; information CHU de Bordeaux - Hôpital Haut-Lévêque - anais.aitgougam@chu-bordeaux.fr







## INTRODUCTION

Depuis 50 ans, la prise en charge des coronaropathies a connu des progrès majeurs. Néanmoins, il persiste un risque de récidive à la suite d'un syndrome coronarien aigu pouvant être réduit par une <u>bonne gestion des traitements et des facteurs de risques.</u>

L'information a donc une place essentielle dans le parcours de soin du patient chronique.

modifier ou arrêter certains est décidé par le médecin

Avoir une routine de prise afin d'éviter les oublis

Avoir un plan de prise adapté à votre quotidien

L'entrainement physique a des effets bénéfiques sur

La durée minimale recommandée est 150 minutes

Quelques recommandations à prendre en compte

d'activité modérée sur 5 jours soit 30 minutes par jour.

Si possible contrôler sa fréquence cardiaque à l'aide

à avoir suffisamment de comprimés

médicaments en cabine

Reprise de l'activité physique :

d'un cardiofréquencemètre.

Boire régulièrement au cours de l'effort

Quels sont les activités physique conseillées?

Marche rapide, cyclisme sur terrain plat, vélo

d'appartement, natation, gymnastique et renforcement

Les traitements sont à récupérer chaque mois à votre

Bien s'organiser en cas de départ en vacances, et veiller

En cas de trajet en avion, il est conseillé de garder vos

Gestion de mes médicaments :



L'objectif était d'améliorer les connaissances des patients sur leur pathologie, sa PEC et le DM implanté.



De mai à août 2022, des **entretiens pharmaceutiques** (EP) ont été réalisés en service de cardiologie **après une pose de stent coronaire**. Un audit avait été effectué au préalable afin de définir le contenu de ces EP.

Ils étaient basés sur la présentation d'un support illustré.

En fin d'entretien, une plaquette d'information était remise aux patients

et un questionnaire de satisfaction était réalisé avec une note globale sur 10 et une évaluation de 6 thématiques allant d'insatisfait à très satistait.

Puis, un questionnaire de connaissances sur 100 points était réalisé par téléphone 1 mois après l'EP.

Les questions portaient sur les points abordés en EP :



- la pathologie,
- l'intervention,
- le DM,
- les traitements médicamenteux,
- le suivi médical
- et la carte patient porteur de DM implantable.

Les patients non entretenus bénéficiaient également de ce questionnaire et constituaient le groupe contrôle. Les résultats des deux groupes ont été comparés.




Sur la période, 44 patients ont été entretenus.



La majorité étaient très satisfaits (87%) avec une note globale de 9.6/10 plus particulièrement sur le contact, la clarté des explications et la plaquette d'information.



Au total, 19 patients du groupe entretien et 15 patients du groupe contrôle avaient répondu au questionnaire de connaissances avec, respectivement, un score moyen de 82.8 points contre 60.8 points.



Aussi, les items traitant de l'intervention et du DM montraient 56.5% de réponses correctes contre 3.5%.

# W DISCUSSION/CONCLUSION —W W

Il existe aujourd'hui **peu de travaux traitant d'EP sur le DM**.

Ces résultats montrent une amélioration des connaissances des patients et leur satisfaction, soulignant l'<u>importance de cette démarche</u>.


Mais, des efforts doivent encore être fournis afin qu'une majorité de patients puissent bénéficier de ces EP avec la **perspective de l'étendre à d'autres DM**.




avec pose de stent

Informations et conseils

Angioplastie coronaire



Dr Aurélie FRESSELINAT (Pharmacien hospitalier – Chef de service) Service Pharmacie des Dispositifs Médicaux Stériles – Hôpital Haut-Lévêque Avenue de Magellan 33600 PESSAC 05.57.65.63.41



porteur d'un stent coronaire et donc des traitements qui y sont associés afin de vous fournir une prise en charge

 Traçabilité sanitaire : votre stent possède un identifiant unique permettant de retracer son circuit en cas d'effets

Que dois-je faire si je ressens une

douleur thoracique?

OU rapidement après la prise de trinitrine (1 minute).

Consultez votre cardiologue dans les 48 heures

(même si la douleur a disparu spontanément)

Douleurs pendant un effort : Asseyez-vous

→ La douleur s'arrête spontanément au repos,

Si la douleur est persistante u si la douleur est apparue au repos et persiste, et/ou vous ressentez un essoufflement, des

une sensation de malaise..

Contactez rapidement le SAMU (15)

Il est important de reconnaître toute variation de

