

# EVALUATION DU BON USAGE DES GANTS AU SEIN DE 4 ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

A. Jeanne<sup>1</sup>, A. Calesse<sup>1</sup>, B. Phan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pharmacie à usage intérieur, Hôpitaux du Sud Manche, Avranches, France

Groupe Hospitalier  
Mont Saint-Michel

Mots clés: Bonnes pratiques, recommandation, hygiène

## Contexte

- Multitude de gants disponibles
  - Stérile ou non stérile
  - Latex, Vinyle, Nitrile
- Interrogations fréquentes des soignants sur le choix des gants
- Sollicitation du pharmacien



## Objectifs

- Evaluer la connaissance des soignants concernant les bonnes pratiques de port des gants
- Rédiger des recommandations de bon usage en collaboration avec le service d'hygiène hospitalière.


## Matériels et méthodes

- Analyse des protocoles des établissements
- Rédaction d'un questionnaire anonyme remis aux services de 4 établissements de santé (ES).
- Plusieurs catégories professionnelles ont été interrogées : aide-soignant (AS), infirmier, infirmier anesthésiste, sage-femme (SF).
- Les non-conformités sont évaluées par rapport au respect des protocoles des ES.




## Résultats

- 231 questionnaires de 22 items recueillis
- Nombre de réponses par catégorie professionnelle :




- **943 non-conformités** ont été relevées soit un taux global de non-conformités de **36%** (943/2616).

- Taux de non-conformité par situation IDE:



- Taux de non-conformité par situation AS/ASH:



TNC < 25% obtenu pour les actions suivantes:

- Réfection d'un pansement de cathéter central
- Pose d'aiguille de Huber
- Sondage urinaire

→ **Nécessite bien des gants stériles**

TNC > 80% obtenu pour les actions suivantes:

- Retrait de cathéters centraux
- Retrait d'aiguille de Huber
- Manipulation de produits cytotoxiques
- Ecrasement des comprimés

→ **Nécessite un port de gants**

QR code pour accéder au verso de l'affiche réalisée :



## Discussion et conclusion

Les TNC sont hétérogènes en fonction des gestes et soins mais ceux-ci sont rassurants au regard du risque infectieux et de l'impact patient. Les non-conformités sont principalement liées à des pratiques inutilement coûteuses ou à un manque de protection du personnel. Les résultats d'évaluation ont été présentés à chaque service de soin afin de les sensibiliser sur les mesures correctives à apporter et les encourager à mieux se protéger. Ce travail a montré l'intérêt d'un document d'information récapitulant les recommandations de port des gants en fonction des gestes et soins et leur bon usage. Il serait intéressant d'évaluer, dans un second temps, l'impact économique et environnemental d'une diminution des taux de non conformité.

## Bon usage des gants

Avant tout port de gant, une hygiène des mains est indispensable.

Respect des précautions "standard" avec port de gants de soins non stériles à usage unique seulement si:

- Risque de contact avec du sang ou tout liquide biologique
- Risque de contact avec une muqueuse (toilette intime, soins de bouche, etc)
- Manipulation de linge souillé ou de déchets
- Risque de contact avec la peau lésée du patient
- Soignant avec une peau lésée

Consignes d'utilisation

- Changer de gants entre deux soins et entre deux patients
- Mettre les gants au plus près du geste et retrait immédiat
- Ne pas laver les gants
- Pas de SHA sur les gants

01

### GANT DE CHIRURGIE STÉRILE

Réservé aux actes de chirurgie et uniquement disponible au bloc opératoire.

02

### GANT D'INTERVENTION STÉRILE

A utiliser pour tout acte infirmier ou médical nécessitant une asepsie.

03

### GANT NON STÉRILE NITRILE

A utiliser lors de la manipulation de médicaments cytotoxiques, de produits chimiques désinfectant, détergents-désinfectants.

04

### GANT NON STÉRILE VINYLE

Appelé « gant de soin », à utiliser en cas de soin nécessitant une protection pour le patient et/ou le soignant (précautions standard).

05

### GANT NON STÉRILE VINYLE SOFT

Gant de soin avec une forme anatomique, réservé aux soins nécessitant dextérité et sensibilité.

06

### ABSENCE DE GANT

Quand le soin réalisé n'expose ni le patient ni le soignant à un risque particulier.

Indication des gants au verso