

de chirurgie orthopédique

Trime E¹, Marlas A¹, Legris A¹, More C¹

¹ Pharmacie à Usage Intérieur, Centre Hospitalier de Rodez

PHEV, EPP, Plaies

Contexte

- Pour améliorer l'**efficacité des soins post-chirurgicaux** et la prise en charge des patients, une **gestion rigoureuse des pansements**, incluant leur **sélection**, leur **utilisation** et leur **renouvellement** est essentielle.
- Le bon usage des pansements en post-opératoire a été identifié comme un **axe d'amélioration** lors de l'**AAPP**¹ réalisé en 2023, dans le cadre du **CAQES**².

¹ Analyse et d'Amélioration des Pratiques Professionnelles

² Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins

Objectif

Identifier les **écarts** et **optimiser** l'usage des pansements en **post-opératoire** de **chirurgie orthopédique**, notamment via une **ordonnance de sortie standardisée**.


Méthode

Mise en place d'une **grille d'audit** pour **recueillir des données** auprès des IBODE (Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat), chirurgiens et IDE (Infirmiers Diplômés d'Etat) du service d'orthopédie.

Résultats


1 Classe de pansements utilisés en fin d'intervention de chirurgie orthopédique:

● Sec ● Gras
● Hydrocellulaire



2 La fréquence moyenne de changement des pansements post-opératoire en service de soins est de **2 jours maximum** pour les **hydrocellulaires**.


3 Classe de pansements utilisés dans les services de soins:



4 Analyses des ordonnances de sortie de prescription de pansements préexistantes:

- Absence d'indications sur le **type**, la **localisation** ou les **caractéristiques de la plaie**.
- Les ordonnances ne précisent ni la durée de la prescription ni le nombre de renouvellements.
- Seuls le **nom de la spécialité** et les **dimensions** sont mentionnés.
- L'ordonnance contient la prescription de médicaments et de pansements.

5 La fréquence des soins IDE à domicile mentionne:



Discussion



- **63,8%** des pansements utilisés au bloc opératoire en chirurgie orthopédique (**hydrocellulaires**) **ne correspondent pas** aux recommandations de 1^{ère} intention.
- La fréquence de changement des **hydrocellulaires** est non-adaptée (*maintien 1 à 2 jours maximum même si le pansement n'est pas souillé*).
- La **périodicité de réfection** des pansements au domicile est en accord avec les recommandations dans **80%** des cas.

Communication des résultats de l'audit aux équipes.



Un support de bon usage des pansements, incluant les classes à utiliser selon le type de plaie a été élaboré.

SCANNEZ-MOI



Ordonnance de sortie standardisée proposée et validée collégialement.



En cours de validation **COMEDIMS*** pour être étendu aux différents services de l'hôpital.

*Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles