Introduction

Une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) de la « perfusion intraveineuse » a été réalisée dans notre établissement. Un point critique souligné est l'identification des perfusions (61% de non-conformités).

Objectif : Mettre à disposition des étiquettes standardisées pour identifier les perfusions intraveineuses.

Matériel et méthodes

Recommandations d'identification de la HAS :

- Les nom et prénom du patient
- La dénomination de la spécialité et le cas échéant la DCI
- Le dosage exprimé en concentration ou en quantité
- La voie d'administration IM, IV, SC.
- L'heure de préparation
- La durée et le débit si nécessaire
- Le nom de l'IDE qui a préparé.

2 propositions d'étiquettes :

Etiquette pour Seringue Auto Pousseuse

Coller étiquette patient	Médicament :
NOM	Quantité totale (mg ou g) :
PRENOM	Volume total (ml) :
XX/XX/XXXX	Concentration finale :
UNITE	Débit : mL/h
	Voie :
	Préparé par :
	Date : / / à h...

Etiquette pour poche

Coller étiquette patient
NOM
PRENOM
XX/XX/XXXX
Médicament :
Quantité totale (mg ou g) :
Volume total (ml) :
Concentration finale :
Débit : gtttes/ min ou mL/h
Voie :
Préparé par :
Date : / / à h...

Infirmières consultées pour évaluer les étiquettes dans 6 services différents : Gastro entérologie, réanimation USC, cardiologie/USIC, pédiatrie/néonatalogie, urgences.

Résultats

38 évaluations recueillies

Points négatifs :

- Mentions inutiles : concentration, volume et quantité (63% des interrogés)
- Lisibilité: étiquette poche trop petite (contrainte par les poches de 50 mL)

Points positifs :

- Identitovigilance grâce à la présence de l'étiquette patient (confidentialité préservée 3 lettres du Nom + 3 lettres du prénom)
- Réal atout lors des transferts et rotations d'équipe
- 71% des infirmiers pensent que l'étiquetage participe à la sécurité du patient

Axes d'amélioration :

- Ajout d'une échelle horaire (début et fin de perfusion)
- Espace pour les ajouts d'électrolytes dans les poches d'hydratations

Surcoût maximal engendré par étiquette : 10 centimes d'euros

Conclusion

L'identification des perfusions est une étape clé dans la prévention des erreurs médicamenteuses. Dans un premier temps, le modèle d'étiquette SAP, prioritaire, (perfusion longue, médicament à risque...), va être diffusé dans les services. L'objectif suivant sera l'impression d'étiquettes à partir du plan de soins informatisé, évitant la retranscription, source d'erreurs.